

This document contains a list of species within the genus *Leptocoris*. It is in German, but one does not need to know German in order to read and understand it. Below each species named is the name of the person who first described that species, information on the type specimen ("Typ. gen."), the known distribution ("Verbr."), a list of publications that mention or describe the species, and synonymous species names. Most country names are similar enough to the English name that they do not require any translation (e.g. "Afrika" or "Asien"). Note that bis=to, zentral=central, o/osten/ost=east, w/westen/westlich=west, n/norden/nord=north, and s/suden/sudlich=south.

SERINETHINAE STÅL, 1873

Serinetharia STÅL, 1873: Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 98

BERG 1878, An. Soc. cient. Arg. 6, 188 (Abdr. 1879, Hem. Arg., 95) (*Serinetharia*) — DISTANT 1882, Biol. Centr. Am., Het. 1, 172; 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 418 (*Serinetharia*) — BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 164 (*Serinetharia*) — PENNINGTON 1922, Phys. B. Aires 5, 169 (*Serinethini*) — HESSE 1925, Ann. S. Afr. Mus. 23, 62 (*Serinetharia*) — HSIAO 1963, Acta ent. Sin. 12, 314 (*Serinethini*) — SCHAEFER 1965, Misc. Publ. ent. Soc. Am. 5, 19 (stat. nov.) — CHOPRA 1967, Trans. ent. Soc. London 119, 386 — HOFFMAN 1975, Bull. Res. Div. Virg. Univ., Nr. 105 (Ins. Virg., Nr. 9), 37 — HSIAO 1977, Handb. Chin. Hem. Het. 1, 260 (*Serinethini*) — FROESCHNER 1981, Smith. Contr. Zool., Nr. 322, 90 (K)

= *Leptocorinae* VAN DUZEE, 1914

Leptocorini VAN DUZEE, 1914: Can. Entomol. 46, 379

VAN DUZEE 1916, Checkl. Hem. Am., 15; 1917, Cat. Hem. Am., 125 — BLATCHLEY 1926, Het. E. N. Am., 283 — DEAY 1928, Kansas Univ. Sci. Bull. 18, 393, 399 — DENNING 1938, M. S. Thesis Iowa St. Coll., 61 (T) — BARBER 1939, Scient. Surv. P. Rico 14, 328 — TORRE-BUENO 1941, Ent. Am. 21, 99 (T) — FROESCHNER 1942, Am. Midl. Natural. 27, 593 (T) — HARRIS 1943, Iowa St. Coll. J. Sci. 17, 197 — KUMAR 1965, Proc. R. Soc. Queensl. 76, 43, 68 (M)

Leptocoris HAHN, 1833

Leptocoris HAHN, 1833: Wz. Ins. 1, 200, Taf. XXXII. D–F (für *rufus*)

Typ. gen.: *rufus* HAHN, 1833 (monotypisch) = *abdominalis* (FABRICIUS, 1803) [DISTANT 1902 für *Serinetha*]

Verbr.: Afrika, SO-Asien, Australien, Ozeanien

BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 305 — BRULLÉ 1835, in: AUDOUIN/BRULLÉ, Hist. nat. Ins. 9, 358 (*Cor. (Leptocoris)*) — STÅL 1870, Sv. Vet. Ak. Handl. 9, Nr. 1, 229 (pt.) — DISTANT 1882, Biol. Centr. Am., Het. 1, 172 — PROVANCHER 1885, Pet. Fn. ent. Can. 3,

65 (pt.) — UHLER 1886, Checkl. Het. N. Am., 13 — KIRKALDY 1905, Trans. ent. Soc. London 1905, 350; 1907, Entomologist 40, 58 (Berichtigung des Publ.datums der Arbeit von HAHN von 1831 auf 1933); 1908, 41, 123 (Festlegung des Gen. nom. *Leptocoris*) — BANKS 1910, Cat. nearct. Hem. Het., 73 (Syn. von *Serinetha*) — VAN DUZEE 1914, Can. Entomol. 46, 379 (Syn. von *Tynotoma* = *Leptocoris* gültiger Name); 1916, Checkl. Hem. Am., 15 (pt.); 1917, Cat. Hem. Am., 125 (pt.) — BLATCHLEY 1926, Het. E. N. Am., 284 (pt.) — DEAY 1928, Kansas Univ. Sci. Bull. 18, 399 (pt.) — DENNING 1938, M. S. Thesis Iowa St. Coll., 61 (pt.) — TORRE-BUENO 1941, Ent. Am. 21, 99 (pt.) — FROESCHNER 1942, Am. Midl. Natural. 27, 593 (pt.) — HARRIS 1943, Iowa St. Coll. J. Sci. 17, 197 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 403 (R pt., T); 1963, Ins. Micron. 7, Nr. 7, 362 (T) — SCHAEFER 1965, Misc. Publ. ent. Soc. Am. 5, 91 — CHOPRA 1967, Trans. ent. Soc. London 119, 387 — HOFFMAN 1975, Bull. Res. Div. Virg. Univ., Nr. 105 (Ins. Virg., Nr. 9), 49 (pt.) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 103 (R pt., T; 2 Species-Gr.: *hexophthalma*- und *abdominalis*-Gruppe)

= *Serinetha* SPINOLA, 1837

Serinetha SPINOLA, 1837: Essai Hem. Het., 247 (= Ersatz des Namens *Leptocoris* wegen großer Ähnlichkeit mit dem Gattungsnamen *Leptocorisa*)

SPINOLA 1850, Tav. sin. Hem., 37 (pt.) — DALLAS 1852, List Hem. II, 459 (pt.) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (pt.) — STÅL 1862, Stett. ent. Ztg. 23, 306 (Abtrennung der *Jadera*-Species; Syn. von *Leptocoris*, *Lygaeomorphus*, *Pyrrhotes*, *Tynotoma*); 1865, Hem. Afr. 2, 112 (T) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 — LETHIERRY/SEVEVRIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 122 — DISTANT 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 418 (Typ. gen. *abdominalis*) — BERGROTH 1906, Wien. ent. Ztg. 25, 9 (Syn. von *Pyrrhotes*); 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 164 (Syn. von *Boisea*) — DISTANT 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 177 — HESSE 1925, Ann. S. Afr. Mus. 23, 62 — SINGH-PRUTHI 1925, Trans. ent. Soc. London 1925, 154 (M) — WU 1935, Cat. Ins. Sin. 2, 403 — VILLIERS 1952, Hém. Afr. Noire, 108 — STICHEL 1961, Ill. Best.-T. Wz. II, 4, 722 — HSIAO 1977, Handb. Chin. Hem. Het. 1, 260 — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 43

= *Lygaeomorphus* BLANCHARD, 1840

Lygaeomorphus BLANCHARD, 1840: in: CASTELNAU LAPORTE, Hist. nat. An., Ins., 3, 116 (Ersatz des gen. nom. *Leptocoris* wegen Ähnlichkeit mit dem Gattungsnamen *Leptocorisa*)

Syn.: STÅL 1862 (zu *Serinetha*)

BLANCHARD 1845, Hist. Ins. 2, 441

= *Pyrrhotes* WESTWOOD, 1842 (pt.)

Pyrrhotes WESTWOOD, 1842: Cat. Hem. Hope II, 6 (Ersatz des gen. nom. *Leptocoris* wegen Ähnlichkeit mit dem Gattungsnamen *Leptocorisa*)

Syn.: STÅL 1862 (zu *Serinetha*); BERGROTH 1906 (Vorschlag: *Pyrrhotes* statt Namen „*Jadera*“)

= *Tynotoma* AMYOT/SERVILLE, 1843

Tynotoma AMYOT/SERVILLE, 1843: Hist. nat. Hem., 220 (für *vittata*)

Typ. gen.: *vittata* AMYOT/SERVILLE, 1843 (monotypisch)

Syn.: STÅL 1862 (zu *Serinetha*); VAN DUZEE 1914 (nom. dubium, da Verlust des Typus)

WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (pt.)

Species dubiae:

haematidea HAHN, 1831 (?): lt. DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 = *Serinetha haematidea* = wahrscheinlich *haematideus* HAHN, 1831: Wz. Ins. 1, 9, Taf. I.3 (*Pyrrhocoris*) (*Pyrrhocoridae*)

longiusculus WALKER, 1872: Cat. Het. V, 60 (*Lygaeus*): lt. BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 = *Serinetha longiuscula*

Andere Zuordnung:

antica WALKER, 1871: Cat. Het. IV, 147 (*Serinetha*) = *Astacops anticus* (WALKER, 1871) (Lygaeidae)
Syn.: DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 432

fascicollis WALKER, 1871: Cat. Het. IV, 147 (*Serinetha*) = *Astacops fascicollis* (WALKER, 1871) (Lygaeidae)

Syn.: DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 432

immunis WALKER, 1871: Cat. Het. IV, 148 (*Serinetha*) = *Astacops fieberi* STÅL, 1865 (Lygaeidae)

Syn.: DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 432

sinae STÅL, 1855: Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, 185 (*Serinetha*) = *Caenocoris (Thunbergia) marginatus* THUNBERG, 1822 (Lygaeidae)

Syn.: STÅL 1866, Berl. ent. Z. 10, 163 (= *Tetralaceus marginatus*)

spurcata WALKER, 1871: Cat. Het. IV, 147 (*Serinetha*) = *Astacops dorycus* BOISDUVAL, 1835 (Lygaeidae)

Syn.: DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 432

turbata WALKER, 1871: Cat. Het. IV, 148 (*Serinetha*) = *Astacops turbatus* (WALKER, 1871) (Lygaeidae)

Syn.: DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 432

abdominalis (FABRICIUS, 1803)

Lygaeus abdominalis FABRICIUS, 1803: Syst. Rhyng., 226

Typus: Sumatra, DOM DALDORFF; Lectotypus ♀ (GÖLLNER-SCHIEDING unveröff.), Mus. Kopenhagen

Verbr.: SO-Asien

BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 305 — BRULLÉ 1835, in: AUDOUIN/BRULLÉ, Hist. nat. Ins. 9, 358 (*Cor. (Lept.)*) — BLANCHARD 1840, in: CASTELNAU LAPORTE, Hist. nat. An., Ins., 3, 116 (*Lygaeomorphus*, mit falschem Fundort „Amer. merid.“) — WESTWOOD 1842, Cat. Hem. Hope II, 6, 26 (*Pyrrhotes*) — DALLAS 1852, List Hem. II, 460 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1868, Sv. Vet. Ak. Handl. 7, Nr. 11, 68 (*Ser.*; Syn. von *angur* pt.); 1870, Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 659 — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — TRYON 1892, Ann. Queensl. Mus. 2, 22 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 122 (*Ser.*) — BREDDIN 1901, Abh. nat. Ges. Halle 24, 17 — DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 428 (*Ser.*; Syn. von *taprobanensis* = var.); 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 419, Fig. (Syn. von *rufus*; irr. Syn. von *bahram*); 1903, Fasc. Malay., Zool., pt. II, 247; 1903, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 12, 477 (*Ser.*) — MAXWELL-LEFROY/HOWLETT 1909, Ind. Ins. Life, 684 (*Ser.*; B) — BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 164 (*Ser.*) — DISTANT 1918, Fn. Brit. India, Rhynch. 7, 172 (*Ser.*) — HOFFMANN 1933, Lingnan Sci. J. 12, 124 (*Ser.*) — WU 1933, Lingnan Sci. J. 12, Suppl., 208 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 266 — WU 1935, Cat. Ins. Sin. 2, 403 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 427, Fig. (Syn. von *marginatus*) — STICHEL 1961, Ill. Best.-T. Wz. II, 4, 722 (*Ser.*) — CHOPRA 1967, Trans. ent. Soc. London 119, 387, Fig. — HSIAO 1977, Handb. Chin. Hem. Het. 1, 260, Taf. 47.611 (*Ser.*)

Faun.: KIRBY 1891, J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93 — BREDDIN 1900, Abh. Senck. nat. Ges. 25, 159; 1901, Abh. nat. Ges. Halle 24, 17; 1905, Mitt. Mus. Hamburg 22, 213 — HOFFMANN 1932, J. Pan-Pac. Res. Inst. 7, 11 — SIENKIEWICZ 1964, Cat. Montandon Coll., 111

= *angur* (FABRICIUS, 1794) (pt.)

Lygaeus angur FABRICIUS, 1794: Ent. Syst. 4, 161

Typus: India orientali?; ?Mus. Kopenhagen

Syn.: STÅL 1868

THUNBERG 1822, Hem. Rostr. Cap., pt. 4, 1 (*Lygaeus*) — BLANCHARD 1840, in: CASTEL-
NAU LAPORTE, Hist. nat. An., Ins., 3, 116 (*Lygaeomorphus*)

Faun.: DISTANT 1891, J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93

= *marginata* BLÖTE, 1934

Leptocoris marginatus BLÖTE, 1934: Zool. Meded. 17, 267

Typus: Minahassa, N-Celebes, P. J. v. d. BERGH leg.; Holotypus ♂, Mus. Leiden (Paratypus Mus. Leiden)

Syn.: GROSS 1960

= *rufus* HAHN, 1833

Leptocoris rufus HAHN, 1833: Wz. Ins. 1, 201, Taf. XXXII.102; 1835, 2, 139

Typus: Brasilien (1833) — Korr. 1835: Insel Radack in der Südsee; keine weiteren Angaben

Syn.: KIRKALDY 1902 (?), da Überprüfung des Typus nicht möglich war)

BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 306 — SPINOLA 1837, Essai Hem. Het., 248 (*Ser. rufa*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser. rufa*)

abdominalis abdominalis (FABRICIUS, 1803)

Verbr.: O-Asien, Formosa, Indonesien, Philippinen

GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 429 (ssp. stat. nov.)

abdominalis bloetei GROSS, 1960

Leptocoris abdominalis bloetei GROSS, 1960: Rec. S. Austr. Mus. 13, 429

Typus: „Mist Camp“, Niederl. Indien, American Neu Guinea-Exp., 1800 m, 9. I. 1939, coll. L. J. TOXOPEUS; Holotypus ♂, Mus. Leiden (Paratypen Mus. Leiden, Mus. Adelaide)

Verbr.: Neu-Guinea

abdominalis taprobanensis (DALLAS, 1852)

Serinetha taprobanensis DALLAS, 1852: List Hem. II, 461

Typus: Ceylon; Typen, Mus. London (wahrsch. Verlust)

Verbr.: Ceylon

Syn.: DISTANT 1901 (= var. von *abdominalis*); BLÖTE 1934 (ssp. stat. nov.)

DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser. taprobanensis*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser. taprobanensis*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser. taprobanensis*) — LE-
THIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser. taprobanensis*) — DISTANT 1901, Ann.
Mag. nat. Hist. (7) 7, 428 (*Ser. abdominalis* var. *taprobanensis*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded.
17, 266 (ssp. stat. nov.) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 428

Faun.: KIRBY 1891, J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93

2 ***aethiops*** (DISTANT, 1901)

Serinetha aethiops DISTANT, 1901: Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 429

Typus: W-Afrika (lt. Text: Calabar, leg. RUTHERFORD), DIST. Coll. 1911—383; Lectotypus ♀ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Mus. London (Paralectotypus Mus. London)

Verbr.: westl. Zentral-Afrika

DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 429 (Syn. von *fraterna* var.) — BERGROTH
1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 164 (*Ser.*) — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge,
Zool. (3) 1, 305 — VILLIERS 1952, Mém. Inst. Franç. Afr. Noire, Nr. 19, 302 (*Ser.*) —
LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 43, Fig. (irrt. Syn. zu *fraterna*) — GÖLLNER-
SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 107, Fig.

Faun.: VILLIERS 1969, Bull. Inst. Franç. Afr. Noire, Sér. A, 31, 1055

= *fraterna* var. (DALLAS, 1852)

Serinetha fraterna var. DALLAS, 1852: List Hem. II, 462

Typus: Sierra Leona, pres. Rev. D. F. MORGAN; Mus. London (1 Angabe)

Syn.: DISTANT 1901

STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 112 (*Ser.*)

3

affinis GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris affinis GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 108, Fig.

Typus: Abessinien, Higo Samula, 30. X. 11, R. J. STORDY, Nr. 329-1912; Holotypus ♂, Mus. London (Paratypus Mus. N. York)

Verbr.: Abessinien, Butandigo/Mont Elgon

ahnnei CHEESMAN, 1927 = *tagalicus* BURMEISTER, 1835

4

albisoleta (BERGROTH, 1912)

Serinetha albisoleta BERGROTH, 1912: Ann. Soc. ent. Belg. 56, 91

Typus: Islet Sainte Marie, East-Madagaskar; keine weiteren Angaben

Verbr.: Madagaskar

BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 164 (*Ser.*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 109, Fig.; 1982, (N. F.) 29, 464

5

amicta GERMAR, 1838

Leptocoris amicta GERMAR, 1838: Silb. Rev. Ent. 5, 144

Typus: Prom. bonae Spei, S-Afrika, leg. DRÈGE; keine weiteren Angaben

Verbr.: Zentral-O-Afrika bis S-Afrika

DALLAS 1852, List Hem. II, 462 (*Ser.*; Syn. von *vittata*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 113 (*Ser.*; Syn. von *moesta*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (*Tynotoma*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 122 (*Ser.*) — SCHOUTEDEN 1910, Wiss. Erg. Schwed. Exp. Kilim. Meru 2, 12, 158; 1911, Rev. Zool. Afr. 1, 189; 1912, 2, 27, Taf. 1.3 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belg., Zool. (3) 1, 305 — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 43, Fig. (*Ser.*)

Faun.: IZZARD 1960, S. Afr. An. Life 7, 484 — SCHOUTEDEN 1913, Rev. zool. Afr. 2, 202

= *moesta* (STÅL, 1855)

Serinetha moesta STÅL, 1855: Öfv. Vet. Ak. Förh. 12, 29

Typus: Caffraria, J. WAHLB. (lt. Text „terra natalensis“); Holotypus ♂, Mus. Stockholm

Syn.: STÅL 1865

BOHEMAN 1848, Ins. Caffr. WAHLBERG coll. 1, 1 ff. (betr. Fundort)

= *vittata* (AMYOT/SERVILLE, 1843)

Tynotoma vittata AMYOT/SERVILLE, 1843: Hist. nat. Hém., 220

Typus: Cap Bonne-Espérance, keine weiteren Angaben

Syn.: DALLAS 1852

amicta amicta GERMAR, 1838

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 110, Fig. (ssp. stat. nov.)

amicta rubra GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris amicta rubra GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 112, Fig.

Typus: Lulua, Kapanga, XI.1932, F. G. OVERLAET; Holotypus ♂, Mus. Tervuren (Paratypen Mus. Tervuren, Mus. Berlin)

Verbr.: Zentral-Afrika

LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 43, Fig. (Det. als *Ser. hexophthalma*)

arorai CHOPRA, 1971 = *dispar* (HSIAO, 1963)

6

augur (FABRICIUS, 1781) (pt.)

Cimex augur FABRICIUS, 1781: Spec. Ins. 2, 366

Typus: India orientali, Mus. Dom BANKS; Typus, Mus. London (BANKS Coll.) (? Typus, Mus. Kopenhagen)

Verbr.: SO-Asien, Arabien, Mauritius, Indonesien

THUNBERG 1784, Nov. Ins. Spec., pt. 3, 57, Fig. (*Cimex*; Fundort: Cap. bonae spei = Rhopalidae?) — FABRICIUS 1787, Mant. Ins. 2, 301 (*Cimex*) — GMELIN 1790, LINNÉ Syst. nat., 13. éd., 1, pars IV, 2174 (*Cimex*; pt.) — STOLL 1792, Wz., Abt. 2, 57, Taf. 18.124 (*Cimex*) — FABRICIUS 1794, Ent. Syst. 4, 161 (*Lygaeus*; pt.); 1803, Syst. Rhyng., 226 (*Lygaeus*; pt.) — TURTON 1806, Syst. Nat. Kingdom 2, Ins. I, 460 (*Ser.*) — BILLBERG 1820, En. Ins. Mus. Billberg, 69 (*Lygaeus*) — BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 305 — WESTWOOD 1842, Cat. Hem. Hope II, 6 (*Pyrrhotes*) — DALLAS 1852, List Hem. II, 460 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1868, Sv. Vet. Ak. Handl. 7, Nr. 11, 68 (Syn. von *chalcocephalus*); 1873, 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 420 (*Ser.*) — KIRKALDY 1907, Entomologist 40, 283 (B) — MAXWELL/HOWLETT 1909, Ind. Ins. Life, 684 (*Ser.*; B) — HOFFMANN 1933, Lingnan Sci. J. 12, 122, Taf. (*Ser.*; M) — WU 1933, Lingnan Sci. J. 12, Suppl., 208 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — WU 1935, Cat. Ins. Sin. 2, 403 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 411, Fig. (Syn. von *dallasi*) — STICHEL 1961, Ill. Best.-T. Wz. II, 4, 722 (*Ser.*) — HSIAO 1963, Acta ent. Sin. 12, 314 (*Ser.*) — COBBEN 1968, Evol. Trends Het. 1, 106 (M) — CHOPRA 1971, Orient. Ins. 5, 507, Fig. — HSIAO 1977, Handb. Chin. Hem. Het. 1, 261, Fig., Taf. 47.613 (*Ser.*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 139

Faun.: MAYR 1868, Reise Fregatta Novara Zool. 2, 1. Abt., 2, Hem., 122 — KIRBY 1891, J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93 — BREDDIN 1909, Ann. Soc. ent. Belg. 53, 295 — ESAKI 1926, Ann. Mus. Hung. 24, 157 — SIENKIEWICZ 1964, Cat. Montandon Coll., 111

= *chalcocephalus* (FABRICIUS, 1803)

Lygaeus chalcocephalus FABRICIUS, 1803: Syst. Rhyng., 226

Typus: Habitat?, keine weiteren Angaben (lt. STÅL 1868 Artengemisch)

Syn.: STÅL 1868

= *dallasi* (DOHRN, 1860)

Serinetha dallasi DOHRN, 1860: Stett. ent. Ztg. 21, 402

Typus: Ceylon; Typen, Verbleib?

Syn.: GROSS 1960

STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 420 (*Ser.*)

Faun.: KIRBY 1891, J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93 — BREDDIN 1909, Ann. Soc. ent. Belg. 53, 295

augur (FABRICIUS, 1781) (pt.) = *abdominalis* (FABRICIUS, 1803)

7

bahram KIRKALDY, 1899

Leptocoris bahram KIRKALDY, 1899: Bull. Liverpool Mus. 2, 46

Typus: Sokotra (adho Dimellus), 3000 ft. 5. II. 99, W. R. OGILVIE GRANT, 1901—289; Lectotypus ♀, Mus. London (Paralectotypus (Larve) Mus. London)

Verbr.: Sokotra

Anm.: Die Art wurde von DISTANT 1902 synonym zu *abdominalis* gestellt, die Überprüfung des Lectotypus ergab jedoch, daß *bahram* kein Synonym zu dieser Art ist.

KIRKALDY 1903, in: FORBES, Nat. Hist. Sokotra, 387, Taf. XXIII. 8

8

capitis (HSIAO, 1963)

Serinetha capitis HSIAO, 1963: Acta ent. Sin. 12, 314, 331, 344

Typus: Yunnan, 6. IV. 1955; Holotypus ♂, Ak. Wiss. Peking (Paratypus Ak. Wiss. Peking),

Verbr.: S-China

- HSIAO 1977, Handb. Chin. Hem. Het. 1, 261, Fig., Taf. 47.612 (*Ser.*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 140
- carnivorus** USINGER, 1946 = *vicina* (DALLAS, 1852)
- chalcocephalus** (FABRICIUS, 1803) = *augur* (FABRICIUS, 1781)
- 9 **chevreuxi** (NOUALHIER, 1898)
Serinetba chevreuxi NOUALHIER, 1898: Bull. Mus. Hist. nat. Paris 4, 233
 Typus: Dákar, III, leg. CHEVREUX; Holotypus ♀, Mus. Paris
 Verbr.: westl. Zentral-Afrika, Kapverdische Inseln
 BLANCHARD 1840, in: CASTELNAU LAPORTE, Hist. nat. An., Ins., 3, 116 (*Lygaeomorphus augur* = der Verbreitung nach wahrscheinlich *chevreuxi*) — DISTANT 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 179 (irrt. Syn. mit *griseiventris*) — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 46, Fig. (irrt. Det. als *haematica*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 113, Fig.; 1982, (N. F.) 29, 464
- 10 **cinnamomensis** IZZARD, 1960
Leptocoris cinnamomensis IZZARD, 1960: S. Afr. An. Life 7, 483, Fig.
 Typus: Anabib/Orumpambe, Kakaoveld, SW-Afrika, 100 miles W Ohopoho, 12-13. VI. 1951; Holotypus ♂, Zool. Inst. Lund (Nr. 339) (Paratypen Zool. Inst. Lund, Mus. London)
 Verbr.: SW-Afrika
- 11 **corniculata** (STÅL, 1867)
Serinetba corniculata STÅL, 1867: Berl. ent. Z. 10, 381
 Typus: India orientalis; Holotypus ♂, Mus. Stockholm
 Verbr.: Indien
 WALKER 1871, Cat. Het. IV, 202 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 420 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 416, Fig.
- 12 **coxalis** (KIRBY, 1891)
Serinetba oxalis KIRBY, 1891: J. Linn. Soc. London, Zool. 24, 93
 Typus: Ceylon, GREEN Coll. 91-26; Holotypus ♂, Mus. London
 Verbr.: Ceylon
 LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 429 (*Ser.*; Syn. von *vicina* pt.); 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 420 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 427, Fig. — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 143
vicina (DALLAS, 1852) (pt.)
Serinetba vicina DALLAS, 1852: List Hem. II, 460
 Syn.: DISTANT 1901
- dallasi** (DOHRN, 1860) = *augur* (FABRICIUS, 1781)
- 13 **dispar** (HSIAO, 1963)
Serinetba dispar HSIAO, 1963: Acta ent. Sin. 12, 314, 344
 Typus: Xunnan, China, 17. V. 1955; Holotypus ♂, Ak. Wiss. Peking (Paratypen Ak. Wiss. Peking)
 Verbr.: Indien, China, Cambodga, Tonkin
 GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 140 (Syn. von *arorai*)
 Faun.: GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N.F.) 29, 464
 = *arorai* CHOPRA, 1971
Leptocoris arorai CHOPRA, 1971: Orient. Ins. 5, 507, Fig.
 Typus: Tamilnadu, Nilgiri Hills, Singara, 1035 m, P. S. NATHAN, V. 1954; Holotypus ♂, Zool.

Surv. Calcutta (Paratypen Zool. Surv. Calcutta, Coll. CHOPRA)
Syn.: GÖLLNER-SCHIEDING 1980

fimbriata (DALLAS, 1852) = *rufomarginata* (FABRICIUS, 1794)

flavomarginata (MATSUMURA, 1913) = *rufomarginata* (FABRICIUS, 1794)

fraterna (WESTWOOD, 1842) = *hexophthalma* (THUNBERG, 1784)

fraterna var. (DALLAS, 1852) = *aethiops* (DISTANT, 1901)

14

griseiventris (WESTWOOD, 1842)

Pyrrhotes griseiventris WESTWOOD, 1842: Cat. Hem. Hope II, 6, 26

Typus: Westafrika; Lectotypus ♂ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), HOPE Dept. Oxford (Paralectotypen HOPE Dept. Oxford, Mus. Leiden)

Verbr.: Zentral-Afrika, Mozambique, NO-Rhodesien

DALLAS 1852, List Hem. II, 462 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 114 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (*Tynotoma*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1901, Proc. zool. Soc. London 1901, Bd. 1, 332 (*Ser.*; irrt. Syn. von *chevreuxi*) — BERGROTH 1913, Ann. Soc. ent. Belg. 57, 239; Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (*Ser.*) — DISTANT 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 179 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306 (*griseoviridis* = wahrsch. Schreibfehler) — VILLIERS 1952, Bull. Inst. Franç. Afr. noire 14, 1204 (*Ser.*) — MANCINI 1953, Ann. Mus. Hist. nat. Genova 66, 197 (var. nov.) — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 45, Fig. — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F) 27, 115, Fig.

Faun.: MANCINI 1954, Atti Mus. Stor. nat. Trieste 19, 153

griseiventris var. *bayoni* MANCINI, 1953

Leptocoris griseiventris var. *bayoni* MANCINI, 1953: Ann. Mus. Hist. nat. Genova 66, 197

Typus: Uganda, Bussu Busoga, 1909, leg. E. BAYON; Typenserie, Mus. Genova

haematica GERMAR, 1838 = *hexophthalma* (THUNBERG, 1784)

15

hexophthalma (THUNBERG, 1784)

Cimex hexophthalma THUNBERG, 1784: Nov. Ins. Spec., pt. 3, 54 (irrt. Schreibweise „*hexophthalma*“)
Typus: Capite bonae spei; Lectotypus ♀ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Univ. Uppsala (ohne Fundortetikett)

Verbr.: Zentral- bis S-Afrika, St. Thomas, Fernando Po, Sokotra ?

GMELIN 1790, Syst. nat. 1, pt. 4, 2179 (*Cimex*) — THUNBERG 1822, Hem. Rostr. Cap., pt. 4, 5 (*Lygaeus*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*; irrt. Syn. von *moesta*) — STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 112 (*Ser.*; irrt. Syn. von *fulcrata*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (*Tynotoma*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306 — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 44, Fig.

Faun.: SCHOUTEDEN 1948, Expl. Parc Albert, Miss. Witte, fasc. 56, 36 — MANCINI 1954, Atti Mus. Stor. nat. Trieste 19, 153 — IZZARD 1960, S. Afr. Ins. Life 7, 485

= *fraterna* (WESTWOOD, 1842)

Pyrrhotes fraterna WESTWOOD, 1842: Cat. Hem. Hope II, 6, 26

Typus: Fundort?; Lectotypus ♀, Hope Dept. Oxford (beschädigt, ohne Fundortetikett)

Syn.: GÖLLNER-SCHIEDING 1980

DALLAS 1852, List Hem. II, 462 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 112 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (*Tynotoma*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1901, Proc. zool. Soc. London 1901, Bd. 1, 332, Taf. (*Ser.*) — BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (*Ser.*) — DISTANT 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 177 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267
Faun.: SCHOUTEDEN 1912, Rev. zool. Afr. 2, 73; 1913, 202

= *haematica* GERMAR, 1838

Leptocoris haematicus GERMAR, 1838: Silb. Rev. Ent. 5, 144

Typus: Cap Gd. Hope; Lectotypus ♀ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Mus. London
Syn.: GÖLLNER-SCHIEDING 1980

DALLAS 1852, List Hem. II, 462 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1865, Hem. Afr. 2, 113 (*Ser.*; irrt. Syn. von *lateralis*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 149 (*Tynotoma*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — SCHOUTEDEN 1910, Wiss. Erg. Schwed. Exp. Kilim. Meru 2, 12, 158 (*Ser.*) — DISTANT 1913, Trans. Linn. Soc. London (2) 16, Zool. 148; 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 179 (*Ser.*) — HESSE 1925, Ann. S. Afr. Mus. 23, 62 (*Ser.*) — BEIER 1938, Handb. Zool. 4, 2. Hälfte, 2. Teil, Ins. 3, 2178, Fig. — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306
Faun.: HESSE 1935, Ann. Transvaal Mus. 16, 594 — LINDBERG 1958, Comm. biol. 19, Nr. 1, 43

= *orodemnias* (LINNAVUORI, 1978)

Serinetha orodemnias LINNAVUORI, 1978: Acta zool. Fenn. 153, 44, Fig.

Typus: nr. Damazin, blue Nile, Sudan, 17.—22. XI. 62, LINNAVUORI; Holotypus ♂, Coll. LINNAVUORI (Paratypus Mus. Tervuren)
Syn.: GÖLLNER-SCHIEDING 1980

hexophthalma hexophthalma (THUNBERG, 1784)

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 117, 148, Fig. (ssp. stat. nov.; Syn. von *fraterna*, *haematica*, *orodemnias*)

Faun.: GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 464

hexophthalmus lateralis (SIGNORET, 1861)

Serinetha lateralis SIGNORET, 1861: Ann. Soc. ent. Fr. (3) 8, 939

Typus: Madagaskar, keine weiteren Angaben

LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 46 (pt. = Tiere aus Madagaskar) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 118, Fig. (ssp. stat. nov.)

16 ***insularis*** KIRKALDY, 1908

Leptocoris insularis KIRKALDY, 1908: Proc. Linn. Soc. London 33, 353

Typus: Rewa, Fiji-Inseln, III, MUIR; Typus (♂), Mus. London (nicht auffindbar)

Verbr.: Fidschi- und Samoa-Inseln

BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (*Ser.*) — CHINA 1930, Ins. Samoa, pt. 2, fasc. 3, 103 — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 432 (irrt. Syn. zu *rufomarginata*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 140, Fig.

17 ***intermedia*** (DISTANT, 1914)

Serinetha intermedia DISTANT, 1914: Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 178

Typus: L. George S., Uganda, C. C. GOWDEY, 7. VI. 11; Holotypus ♂, Mus. London (Nr. 2769)

Verbr.: Zentral-O-Afrika

SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306; 1948, Expl. Parc Albert, Miss. Witte, fasc. 56, 36 (nov. var. *pectoralis*) — VILLIERS 1952, Bull. Inst. Franç. Afr. Noire 14, 1204 (Ser.) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 119, Fig.
 Faun.: SCHOUTEDEN 1957, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. 58, 298 — VILLIERS 1969, Bull. Inst. Franç. Afr. Noire 31 A, 1055

intermedia var. *pectoralis* SCHOUTEDEN, 1948 = *pectoralis* SCHOUTEDEN, 1948

18

isolata (DISTANT, 1914)

Serinetha isolata DISTANT, 1914: Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 179

Typus: Oceania; Marshall-Inseln (?); Lectotypus ♂, Mus. London (Paralectotypus Mus. London)
 Verbr.: Neu-Guinea, Ozeanien

DISTANT 1920, Ann. Mag. nat. Hist. (9) 6, 148 (Ser.) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 443, Fig. (Syn. von *lariversi*); 1963, Ins. Micron. 7, Nr. 7, 368, Fig.

Faun.: SUGERMAN 1972, Proc. Hawai. ent. Soc. 21, 278

isolata isolata (DISTANT, 1914)

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 141 (ssp. stat. nov.)

isolata lariversi USINGER, 1952

Leptocoris lariversi USINGER, 1952: Proc. Hawai. ent. Soc. 14, 520, Fig.

Typus: Imrodj Isl., Jaluit Atoll, Aug. 24, 1946, H. K. TOWNES; Holotypus ♂, Mus. Washington (Paratypen Mus. Washington?)

Verbr.: Marshall-Inseln

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 141 (ssp. stat. nov.)

19

lanuginosa (LETHIERRY, 1881)

Serinetha lanuginosa LETHIERRY, 1881: Ann. Mus. Stor. nat. Genova 16, 288

Typus: Let-Marefia, Äquatorial-Afrika (1 Tier); keine weiteren Angaben

Verbr.: Zentral-Afrika

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 120

lariversi USINGER, 1952 = *isolata lariversi* USINGER, 1952

20

lata GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris lata GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 121, Fig.

Typus: Chinchoxo, FALKENSTEIN S.; Holotypus ♂, Mus. Tervuren (Paratypen Mus. Tervuren, Mus. Berlin)

Verbr.: Zentral-Afrika

lateralis (SIGNORET, 1861) = *hexophthalma lateralis* (SIGNORET, 1861)

longirostris (DALLAS, 1852) = *vicina* (DALLAS, 1852)

21

longiuscula (WALKER, 1872)

Lygaeus longiuscula WALKER, 1872, Cat. Hem. V, 60

Typus: Celebes; Typus nicht auffindbar — Species dubia

Verbr.: Celebes

BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (Ser.)

lurida (DALLAS, 1852) = *tagalica* BURMEISTER, 1834

marginata BLÖTE, 1934 = *abdominalis* (FABRICIUS, 1803)

22

marquesensis CHEESMAN, 1926

Leptocoris marquesensis CHEESMAN, 1926: Ann. Mag. nat. Hist. (9) 18, 368, Fig.

Typus: Fatu-hiva, Marquesas-Inseln; Holotypus ♂, Mus. London (Paratypen Mus. London (♀ unbekannt)

Verbr.: Marquesas-Inseln

CHEESMAN 1927, Trans. ent. Soc. London 75, 156 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 447

23

minuscula BLÖTE, 1934

Leptocoris minuscula BLÖTE, 1934: Zool. Meded. 17, 267, Fig.

Typus: Macklot, Timor; Holotypus ♂, Mus. Leiden (Paratypus Mus. Leiden)

Verbr.: Timor

GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 413, Fig.

24

mitellata BERGROTH, 1916

Leptocoris mitellatus BERGROTH, 1916: Proc. R. Soc. Victoria (N.S.) 29, pt. I, 31

Typus: Australien (bei Glen Helen, Mac Donald Range; Illamurta, James Range); Verbleib unbekannt

Verbr.: Australien, Neuseeland (?)

EVANS 1928, Ann. Mag. nat. Hist. (10) 2, 463 (*Lept. (Ser.)* sp.) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 269 — WOODWARD 1951, Trans. Soc. N. Zeal. 79, 207 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 418, Fig., Taf. XLVIII — KUMAR 1965, Proc. R. Soc. Queensl. 76, 68, 81, Fig. (M); 1966, Austr. J. Zool. 14, 95, Fig. (M, B)

moesta (STÅL, 1855) = *amicta* GERMAR, 1837

25

mutilata (GERSTAECKER, 1873)

Astacops mutilatus GERSTAECKER, 1873: in: DECKEN Reisen Ostaf. 3, 2. Abt., Ins. 412, Taf. XVII. 3

Typus: b. Bombas, O-Afrika, v. D. DECKEN, IX. 1862; Lectotypus ♀ (brachypter) (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Mus. Berlin (Nr. 9190) (Paralectotypus Mus. Berlin)

Verbr.: Zentr. und östl. Teil Zentral-Afrikas, Madagaskar

LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser. mutabilis*) — SCHOUTEDEN 1910, Wiss. Erg. Schwed. Exp. Kilim. Meru 2, 12.9, 158 (*Ser.*) — DISTANT 1914, Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 177 — SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306 — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 122, Fig. (Syn. von *oreias*); 1982, (N. F.) 29, 464

Faun.: SCHOUTEDEN 1948, Expl. Parc Albert, Miss. Witte, fasc. 56, 36

= *oreias* (LINNAVUORI, 1978)

Serimetha oreias LINNAVUORI, 1978: Acta zool. Fenn. 153, 44, Fig.

Typus: Singa, Sudan, 15. — 17. XI. 1962; Holotypus ♂, Coll. LINNAVUORI (Paratypen Mus. Tervuren)

Syn.: GÖLLNER-SCHIEDING 1980

nigricornis (WALKER, 1872) = *vicina* (DALLAS, 1852)

26

nigrofasciata (DISTANT, 1914)

Serimetha nigrofasciata DISTANT, 1914: Ann. Mag. nat. Hist. (8) 13, 178

Typus: Nandi Escarpment, Brit. E. Afrika, 29. V. 1911, leg. S. A. NEAVE, 5800 ft.; Lectotypus ♂, Mus. London (Nr. 1912—193) (lt. Text mehrere Längenangaben)

Verbr.: Mittl. und östl. Teil Zentral-Afrikas

SCHOUTEDEN 1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306 — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 44, Fig. (*Ser.*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 124, Fig.

Faun.: SCHOUTEDEN 1948, Expl. Parc Albert, Miss. Witte, fasc. 56, 36 — GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 464

27

obscura GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris obscura GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 125, Fig.

Typus: Kalonge bei Tshibinda, Kivu; Holotypus ♂, Mus. Tervuren (Paratypus Mus. London)

Verbr.: Hochgebirge Zentral-O-Afrika

oreias (LINNAVUORI, 1978) = *mutilata* (GERSTAECKER, 1873)

orodemnias (LINNAVUORI, 1978) = *hexophthalma* (THUNBERG, 1784)

28 *paramicta* GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris paramicta GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 126, Fig.

Typus: nördl. Kiwu-See, Niragongo, 2700 m. X. 07, Exped. Herzog Adolf Friedrich z. Mecklenburg; Holotypus ♂, Mus. Berlin (Paratypen Mus. London, Mus. Tervuren)

Verbr.: Östl. Teil Zentral-Afrikas

29 *pectoralis* SCHOUTEDEN, 1948

Leptocoris intermedia var. *pectoralis* SCHOUTEDEN, 1948: Expl. Parc Albert, Miss. Witte, fasc. 56, 36
Typus: Camp Ruindi (1000), 20. XI. 1934, G. F. DE WITTE, Parc Albert; Lectotypus ♂ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Mus. Tervuren

Verbr.: Östl. Teil Zentral-Afrikas, Sudan, Senegal

SCHOUTEDEN 1957, Ann. Mus. Congo Belge, 8°, Sci. zool. 57, 298 (*intermedia* var. *pectoralis*) — LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 44 (irrt. Det. als *intermedia*)

pectoralis pectoralis SCHOUTEDEN, 1948

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 127, Fig. (ssp. stat. nov.)

Faun.: GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 464

pectoralis camerunensis GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris pectoralis camerunensis GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 128

Typus: Cameroun, B. DE MIRÉ, Benoué, Grand Capitaine, 29. X. 1977; Holotypus ♂, Mus. Paris (Paratypen Mus. Paris, Mus. Berlin)

Verbr.: Kamerun

30 *producta* GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris producta GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 128, Fig.

Typus: Libenge, Congo Belge, 20. XI. 1947, R. CREMER — M. NEUMANN, Mission Mawuya; Holotypus ♂, Mus. Brüssel (Paratypen Mus. Brüssel, Mus. Berlin)

Verbr.: Zentral-Afrika

31 *rufomarginata* (FABRICIUS, 1794)

Lygaeus rufomarginata FABRICIUS, 1794: Ent. Syst. 4, 152

Typus: India orientali, Mus. D. DE SCHESTEDT; Lectotypus ♀ (GÖLLNER-SCHIEDING), Mus. Kopenhagen (Paralectotypus Mus. Kopenhagen)

Verbr.: SO-Asien, Celebes, Australien, Neu-Guinea, Ozeanien, Philippinen **Okinawa (Japan)**

FABRICIUS 1803, Syst. Rhyng., 220 (*Lygaeus*) — TURTON 1806, Syst. Nat. Kingdom 2, Ins. I, 658 (*Cimex*) — BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 306 (*Lygaeus*) — DALLAS 1852, List Hem. II, 460 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — MAYR 1868, in: Reise Freg. Novara, Zool. 2, 1. Abt., 2, 122 (*Ser.*) — STÅL 1868, Hem. Fabr. I, 68 (*Ser.*); 1870, Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 659 — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 419 (*Ser.*) — KIRKALDY 1905, Trans. ent. Soc. London 1905, 350 — ESAKI 1926, Ann. Mus. Hung. 24, 157 (Syn. von *flavomarginata*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 269 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 432, Fig. (Syn. von *fimbriata*, *spectabilis*, *taitense*; irrt. Syn. von *insularis*); 1963, Ins. Micron. 7, Nr. 7, 365, Fig. — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 140

= *fimbriata* (DALLAS, 1852)

Serinettha fimbriata DALLAS, 1852: List Hem. II, 462

Typus: New Holland; Holotypus ♀ (beschädigt), Mus. London

Syn.: GROSS 1960

DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 267

= *flavomarginata* (MATSUMURA, 1913)

Lygaeus flavomarginatus MATSUMURA, 1913: Thous. Ins. Japan Add. 1, 141, Taf. XIV. 4 (jap. und engl.) (irrt. als Lygacidae eingeordnet)

Typus: Okinawa (Riukiu), leg. K. KUROIWA; ♂ und ♀ zitiert, Verbleib nicht bekannt
Syn.: ESAKI 1926

MATSUMURA 1931, 6000 ill. Ins. Japan-Emp., 1199, Fig. (*Lygaeus*)

= *spectabilis* BREDDIN, 1901

Leptocoris spectabilis BREDDIN, 1901: All. Ztg. Ent. 6, 114

Typus: Toli-Toli, N-Celebes, XI–XII 95, H. FRUHSTORFER (im Text ohne Fundort); Lectotypus ♀ (GROSS 1960), Inst. Eberswalde (früher DEI) (Paralectotypen Inst. Eberswalde, Mus. Budapest)
Syn.: GROSS 1960

BREDDIN 1901, Abh. nat. Ges. Halle 24, 17, 75 — BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 269

= *taitense* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1830)

Lygaeus taitense GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1830: Voy. Coquille, Zool. 2, pt. 2, Div. 1, 178, Taf. XII. 15

Typus: Taiti; Typus wahrscheinlich Verlust
Syn.: GROSS 1960

rufus HAHN, 1833 = *abdominalis* (FABRICIUS, 1803)

32 *seidenstueckeri* GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris seidenstueckeri GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 130, Fig.

Typus: Insel Sansibar, HILDEBRANDT; Holotypus ♂, Mus. Berlin (Nr. 9325) (Paratypen Mus. London)

Verbr.: Sansibar, Zentral-Afrika

spectabilis BREDDIN, 1901 = *rufomarginata* (FABRICIUS, 1794)

33 *stehliki* GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris stehliki GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 131, Fig.

Typus: Kafu R. near Hoima, Kampala Rd., 3500 ft., Uganda Prot. 29.—31. Dec. 1911, S. A. NEAVE; Holotypus ♂, Mus. London (Paratypen Mus. London, Mus. Berlin)

Verbr.: Zentral-Afrika

LINNAVUORI 1978, Acta zool. Fenn. 153, 45, Fig. (irrt. Det. als *griseiventris*)

Faun.: GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 464

34 *subrufescens* (KIRBY, 1888)

Lygaeus subrufescens KIRBY, 1888: Proc. zool. Soc. London 1888, 553

Typus: Christmas-Inseln, Ind. Ozean, 1. IV. 1933; Typen (♂♀), Mus. London

Verbr.: Christmas-Inseln, Ozeanien

KIRBY 1900, Mon. Christmas Isl., 128, Taf. 15.3 (*Lygaeus*) — DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 539 (*Ser.*) — BERGROTH 1913, Mém. Soc. ent. Belg. 22, 165 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 426, Fig.

subrufescens subrufescens (KIRBY, 1888)

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 141 (ssp. stat. nov.)

subrufescens flava GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris subrufescens flava GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 141

Typus: Yap, W-Karolinen, SENFT S.; Holotypus ♂, Mus. Berlin (Paratypen Mus. Berlin, Mus. Adelaide, Inst. Eberswalde)

Verbr.: Karolinen

35 tagalica BURMEISTER, 1834

Leptocoris tagalicus BURMEISTER, 1834: N. Acta Leop. 16, Suppl., 299 (Abdr. 1834, in: MEYEN, 423) (als „*Ceptocoris*“, subgen. von *Lygaeus*)

Typus: Manila, ESCHSCHOLTZ; Lectotypus ♂ (GÖLLNER-SCHIEDING 1980), Mus. Berlin (Paralectotypus Mus. Berlin)

Verbr.: Australien, Celebes, Ozeanien, Philippinen

BURMEISTER 1835, Handb. Ent. 2, 306 — DALLAS 1852, List Hem. II, 460 (*Ser.*) — DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — STÅL 1870, Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 659 — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 99 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 269 — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 439, Fig., Taf. XLVIII; 1963, Ins. Micron. 7, Nr. 7, 367, Fig. — KUMAR 1965, Proc. R. Soc. Queensl. 76, 70, 81, Fig. (M); 1966, Austr. J. Zool. 14, 961, Fig. (B, M) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 141

Faun.: BREDDIN 1905, Mitt. Mus. Hamburg 22, 213

= *abnnei* CHEESMAN, 1927

Leptocoris abnnei CHEESMAN, 1927: Trans. ent. Soc. London 75, 156 = nom. nov. für *taitensis* CHEESMAN, 1926

Syn.: GROSS 1960

= *lurida* (DALLAS, 1852)

Serinetha lurida DALLAS, 1852: List Hem. II, 461

Typus: Patria?; Holotypus ♂, Mus. London

Syn.: GROSS 1960 (?)

DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 429 (*Ser.*)

= *taitensis* CHEESMAN, 1926

Leptocoris taitensis CHEESMAN, 1926: Ann. Mag. nat. Hist. (9) 18, 369, Fig.

Typus: N. Tahiti, Society Islands, 6. III. 25, L. E. CHEESMAN; Lectotypus ♂, Mus. London (Paralectotypen Mus. London = Verlust?)

Syn.: CHEESMAN 1927 (nom. praeocc., Ersatz durch *abnnei*)

= *vulgaris* BERGROTH, 1916

Leptocoris vulgaris BERGROTH, 1926: Proc. Soc. Victoria (N. S.) 29, pt. I, 32

Typus: Zentral-Australien (versch. Fundorte), leg. W. BALDWIN SPENCER; keine weiteren Angaben (Typus wahrscheinlich verloren)

Syn.: GROSS 1960 (?)

BLÖTE 1934, Zool. Meded. 17, 269

taitense (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1830) = *rufomarginata* (FABRICIUS, 1794)

taitensis CHEESMAN, 1926 = *tagalica* BURMEISTER, 1834

taprobanensis (DALLAS, 1852) = *abdominalis taprobanensis* (DALLAS, 1852)

36 teyrovskyi GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris teyrovskyi GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 132, Fig.

Typus: Lulua, Kapanga, XI. 1932, G. F. OVERLAET; Holotypus ♂, Mus. Tervuren (Paratypen Mus. Tervuren, Mus. Berlin, Mus. Brüssel)

Verbr.: Mittl. und östl. Teil Zentral-Afrikas

7 toricollis (BERGROTH, 1893)

Serinetha toricollis BERGROTH, 1893: Rev. Ent. 12, 198, 200

Typus: Mahé, I. Seychelles, III–V 1892, ALLUAUD; Lectotypus ♂ (GÖLLNER-SCHIEDING 1982), Mus. Paris (Paralectotypus Mus. Paris)

Verbr.: Seychellen

LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 123 (*Ser.*) — DISTANT 1913, Trans. Linn. Soc. London (2) 16, Zool., 148 (*Ser.*) — GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 134, Fig.; 1982, (N. F.) 29, 464 (Festlegung des Lectotypus)

38

verticalis GÖLLNER-SCHIEDING, 1982

Leptocoris verticalis GÖLLNER-SCHIEDING, 1982: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 465, Fig.

Typus: Côte d'Ivoire, Reg. de San Pedro, G. THOIRÉ, 1901; Holotypus ♀, Mus. Paris (Paratypen Mus. Paris, Mus. Berlin)

Verbr.: Elfenbeinküste, Kenia

39

vicina (DALLAS, 1852) (pt.)

Serinettha vicina DALLAS, 1852: List Hem. II, 460

Typus: Philippinen, Mr. CUNNING'S Coll.; Holotypus ♂, Mus. London

Verbr.: SO-Asien, Ozeanien, Philippinen

DOHRN 1859, Cat. Hem., 27 (*Ser.*) — WALKER 1871, Cat. Het. IV, 146 (*Ser.*) — STÅL 1873, Sv. Vet. Ak. Handl. 11, Nr. 2, 100 (*Ser.*) — LETHIERRY/SEVERIN 1894, Cat. gén. Hém. 2, 124 (*Ser.*) — DISTANT 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 7, 429, 540 (*Ser.*; Syn. von *nigricornis*); 1902, Fn. Brit. India, Rhynch. 1, 420 (*Ser.*) — GROSS 1960, Rec. S. Austr. Mus. 13, 422, Fig. (Syn. von *carnivorus*, *longirostris*); 1963, Ins. Micron. 7, Nr. 7, 363, Fig.

= *carnivorus* USINGER, 1946

Leptocoris carnivorus USINGER, 1946: Bull. Bishop Mus., Nr. 189, 13, 25, Fig.

Typus: Cetti Bay, Guam, Karolinen, May 28, SWETZEY/USINGER; Holotypus ♂, Bishop Mus. Honolulu (Paratypen Bishop Mus. Honolulu ?)

Syn.: GROSS 1960

= *longirostris* (DALLAS, 1852)

Serinettha longirostris DALLAS, 1852: List Hem. II, 461

Typus: Java, East India Comp. Coll.; Holotypus ♂, Mus. London

Syn.: GROSS 1960

= *nigricornis* (WALKER, 1872)

Astacops nigricornis WALKER, 1872: Cat. Het. V, 36

Typus: Timor, pres. W. W. SAUNDERS; Holotypus ♂, Mus. London

Syn.: DISTANT 1901

vicina (DALLAS, 1852) (pt.) = *coxalis* (KIRBY, 1891)

vittata (AMYOT/SERVILLE, 1843) = *amicta* GERMAR, 1837

vulgaris BERGROTH, 1916 = *tagalica* BURMEISTER, 1834

40

wagneri GÖLLNER-SCHIEDING, 1980

Leptocoris wagneri GÖLLNER-SCHIEDING, 1980: Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 135, Fig.

Typus: Guinea, leg. THONNING; Holotypus ♂, Mus. Kopenhagen (Paratypen Mus. Kopenhagen, Mus. Berlin)

Verbr.: Guinea, Dahomey

Faun.: GÖLLNER-SCHIEDING 1982, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 29, 464

Boisea KIRKALDY, 1910

Leptocoris (Boisea) KIRKALDY, 1910: Proc. Hawai. ent. Soc. 2, 123 (für *trivittata*)

Typ. gen.: *trivittata* (SAY, 1825) (monotypisch)

Verbr.: N-Amerika, Zentral-Afrika, Indien

GÖLLNER-SCHIEDING 1980, Dtsch. ent. Z. (N. F.) 27, 144 (gen. stat. nov.)

Leptocoris HAHN, 1833 (pt.): STÅL 1870, Sv. Vet. Ak. Handl. 9, Nr. 1, 226 — UHLER 1876, Bull. U. S. geol. geogr. Surv. Terr. 1 ((2) Nr. 5), 301; 1877, 3, 408 — DISTANT